

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Responsabile dr. Fabrizio Briganti Piccoli – 040 3171254 - f.briganti@salustrieste.it

dr. Luca Calligaris

Responsabile Infermieristica: Luisa Borca - l.borca@salustrieste.it

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA

Nota informativa per i pazienti

Cognome nome del paziente:

Esame prenotato per il giorno:

alle ore:

Il paziente è pregato di presentarsi, il giorno dell'esame, con la seguente documentazione:

- Richiesta del medico curante
- Eventuale elenco delle terapie in atto (medicine che sta assumendo)
- Eventuale documentazione clinica (referti endoscopici o radiologici precedenti)
- Eventuale elettrocardiogramma (solo se recente)
- Eventuali esami del sangue (emocromo, PT, PTT)

Dopo l'esame il paziente dovrà essere accompagnato e non dovrà guidare alcun veicolo

Per la pulizia intestinale utilizzare: un purgante salino (LOVOL-dyl + LOVOL-Esse)

Avvertenze particolari:

contattare almeno 7 giorni prima dell'esame il medico curante se:

- Si assumono farmaci anticoagulanti (Sintrom, Coumadin, ecc)
- Diabetici in trattamento con insulina o altri farmaci.

Per una eventuale valutazione, rispettivamente, di dosaggio o terapia

Cosa fare per la preparazione dell'esame

Tre giorni prima dell'esame iniziare una dieta priva di scorie (non assumere frutta, verdura, cibi integrali).

Seguire scrupolosamente una delle due modalità di preparazione di seguito riportate:

- Durante la preparazione all'esame e anche il giorno stesso, si può continuare ad assumere la terapia in corso.
- E' tuttavia opportuno mantenere un intervallo di almeno 1-2 ore tra l'assunzione dei farmaci per via orale e l'inizio della preparazione.

Il contenuto di una busta di LOVOL-Esse va disciolto in 500 ml di acqua. Ripetere l'operazione per le rimanenti tre buste.

Raffreddare la soluzione per renderla più gradevole.

SERVIZIO DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA

Responsabile dr. **Fabrizio Briganti Piccoli** – 040 3171254 - f.briganti@salustrieste.it

dr. Luca Calligaris

Responsabile Infermieristica: Luisa Borca - l.borca@salustrieste.it

Preparazione intestinale con Lovol-Esse

La preparazione intestinale con Lovol-Esse può essere effettuata secondo due modalità sotto riportate, dipendenti dall'ora in cui è fissato l'esame.

***Modalità 1: esame programmato per il primo mattino (ore 8.00-10.30)**

Il pomeriggio precedente il giorno dell'esame assumere:

alle ore 16.00 3 compresse di Lovol Dyl da 5 mg.

Se già utilizzatori di lassativi (senna, cascara, bisacodile, piro-solfato ecc.) la dose deve essere aumentata a 4 compresse.

Alle ore 20.00 bere la soluzione Lovol-Esse.

Bere 250 cc (un bicchiere grande) ad intervalli di 15-20 minuti. L'intera soluzione viene assunta in circa 2-3 ore.

La mattina dell'esame bere solo acqua non gassata, tè, tisane anche zuccherate.

***Modalità 2: esame programmato per la tarda mattinata (dopo le 11.00) o pomeriggio**

La sera precedente il giorno dell'esame assumere:

alle ore 22.00 o prima di coricarsi, 3 compresse di Lovol Dyl da 5 mg.

Se già utilizzatori di lassativi (senna, cascara, bisacodile, piro-solfato ecc.) la dose deve essere aumentata a 4 compresse.

Se l'esame è previsto in tarda mattinata (ore 11.00-13.00)

Alle ore 7.00 bere la soluzione di Lovol-Esse.

Bere 250 cc (un bicchiere grande) ad intervalli di 15-20 minuti. L'intera soluzione (2 litri) dovrà pertanto essere assunta in circa 2-3 ore.

Se l'esame è previsto nel pomeriggio (14.00-18.00)

Alle ore 10.00 bere la soluzione di Lovol-Esse

Bere 250 cc (un bicchiere grande) ad intervalli di 15-20 minuti. L'intera soluzione (2 litri) dovrà pertanto essere assunta in circa 2-3 ore.

Note:

- Occorre astenersi da cibi solidi all'inizio dell'assunzione di Lovol-Esse fino all'esecuzione dell'esame.
- L'apporto di acqua non gassata è libero: Salvo diversa indicazione medica astenersi dall'assunzione di liquidi almeno 1 ora prima dell'esame.
- Può comparire gonfiore o distensione addominale prima della prima evacuazione. Se il gonfiore diventa fastidioso si consiglia di interrompere temporaneamente l'assunzione della soluzione o bere ciascuna porzione (250 ml) ad intervalli maggiori (ad esempio ogni circa 30 minuti) finché i sintomi non scompaiono.
- Durante la preparazione intestinale è opportuno tenersi vicino ad un bagno. Lovol-Esse determina la comparsa di evacuazioni liquide, generalmente dopo circa 1 ora, dall'inizio dell'assunzione della soluzione.